

Complication	Fréquence moyenne %	Signes	Actions à prendre en considération
Infection Mineure	4	infection cutanée autour de l'insertion de la sonde	Pommades antibiotiques locales
Majeure	1	Fièvre, hypotension, diaphorèse (transpiration)	Consulter médecin
Saignement Mineur	<1	Saignement autour du site d'insertion	Consulter médecin
Majeur	Presque nul	Hypotension, chute de l'hématocrite, saignement franc.	Urgence médicale, stabiliser la personne et consulter médecin
Diarrhée et crampes	12	Douleur, diarrhée, déshydratation	Examiner l'abdomen pour déceler des signes d'obstruction* Consulter médecin Exclure éventuelle infection gastro-intestinale Consulter le nutritionniste (peut nécessiter de changer la composition)
Nausées et vomissements	9	Nausées, vomissement, distension abdominale, déshydratation	Vérifier les résidus*, le ralentissement* du débit, Examiner l'abdomen pour déceler des signes d'obstruction* éviter l'inhalation. Consulter le médecin et le nutritionniste
Problème mineur de la sonde Délogement	4	Le tube n'est plus en place	Replacer la sonde (une sonde de Foley est parfois utilisée)
Obstruction		Interruption du flux de l'alimentation administrée	Nettoyer la sonde avec de l'eau plate ou gazeuse
Fuite		Fuite autour de tube	La sonde peut devoir être remplacée (une sonde de Foley est parfois utilisée) Consulter le médecin
Problème majeur (Perforation intestinale)	<1	Absence de bruits intestinaux abdomen tendu, nausées, vomissements, diarrhée ou absence de mouvements intestinaux (impaction fécale), hypotension	Urgence médicale Consulter immédiatement le médecin