

Déclenchement du CAP Maltraitance

Vous devez compléter les items suivants de l'instrument d'évaluation pour pouvoir générer ce CAP dans BelRAI.

1. Home Care

SECTION A. INFORMATIONS D'IDENTIFICATION

13. CONDITIONS DE VIE

c. Le client ou l'aidant principal estime qu'il serait mieux s'il vivait ailleurs

- 0. Non
- 1. Oui, dans une autre habitation
- 2. Oui en institution

SECTION E. HUMEUR ET COMPORTEMENT

1. SIGNES D'HUMEUR DEPRESSIVE, ANXIEUSE OU TRISTE

Coder les indicateurs observés durant les 3 DERNIERS JOURS quelle qu'en soit la cause
[Note: demandez à la personne chaque fois que possible]

- 0. Non présents
- 1. Présents mais non observé durant les 3 derniers jours
- 2. Manifestés 1-2 jours durant les 3 derniers jours
- 3. Manifestés quotidiennement ces 3 derniers jours

i. **Retrait des activités intéressantes** - par ex. perte d'intérêt pour des activités jusqu'ici appréciées ou à être avec sa famille / ses amis

j. **Rapports sociaux réduits**

SECTION F. BIEN ETRE PSYCHO-SOCIAL

1. RELATIONS SOCIALES

[Note: demandez au client, au personnel soignant directement en contact, à la famille si elle est présente]

- 0. Jamais
- 1. Il y a plus de 30 jours
- 2. Entre 8 et 30 jours
- 3. Entre 4 et 7 jours
- 4. Durant les 3 derniers jours
- 8. Impossible à déterminer

d. **Conflit ou colère vis-à-vis de la famille ou des amis**

e. **A peur d'un membre de la famille ou de l'entourage**

f. **Négligé(e), abusé(e), maltraité(e)**

2. SOLITUDE

Le client dit ou indique qu'il se sent seul

- 0. Non
- 1. Oui

SECTION J. PROBLEMES DE SANTE

3. FREQUENCE DES PROBLEMES DE SANTE

[Codez pour les 3 derniers jours]

- 0. Non présent
- 1. Présent mais non apparent durant les 3 derniers jours
- 2. Manifesté 1 des 3 derniers jours
- 3. Manifesté 2 des 3 derniers jours
- 4. Manifesté quotidiennement les 3 derniers jours

t. Hygiène (absence anormale d'hygiène, négligence)

7. ETATS MORBIDES INSTABLES

- 0. Non
- 1. Oui

a. Problème de santé ou maladies rendant instables l'état cognitif, les AVQ, l'humeur ou le comportement - (fluctuant, précaire ou se détériorant)

8. PERCEPTION DE LA SANTE

Demandez: "En général, comment appréciez-vous votre santé?"

- 0. Excellente
- 1. Bonne
- 2. Passable
- 3. Mauvaise
- 8. Ne peut (ou ne veut) répondre

SECTION K. ETAT NUTRITIONNEL / BUCCO-DENTAIRE

2. PROBLEMES NUTRITIONNELS

- 0. Non
- 1. Oui

a. Perte de poids de 5 % ou plus au cours des 30 derniers jours, ou de 10 % ou plus au cours des 180 derniers jours

c. Apport de liquide de moins d'1 litre/jour (moins de 4 tasses de 250cc.)

SECTION M. MEDICAMENTS

3. RESPECT DES PRESCRIPTIONS MEDICAMENTEUSES DES MEDECINS

- 0. Respecte tout le temps
- 1. Respecte au moins 80% du temps
- 2. Respecte moins de 80% du temps, en excluant le fait de ne pas avoir acheté les médicaments
- 8. Aucun médicament prescrit

SECTION P. SOUTIENS SOCIAUX

2. ETAT DES AIDANTS

0. Non

1. Oui

b. L'aidant principal exprime des sentiments de détresse, de colère ou de dépression

IMC ou BMI

Le « Body Mass Index » ou « Indice de Masse Corporelle » (appelé aussi Indice de Quételet, d'après le Professeur gantois Quételet) est une méthode qui permet d'évaluer la corpulence d'une personne et de déterminer si elle est ou non obèse.

Cet indice se calcule via une formule mathématique simple : **IMC = poids (kg) / taille² (m)**

Le poids étant exprimé en kg et la taille en mètre.

L'OMS a défini cet indice de masse corporelle comme le standard pour évaluer les risques liés au surpoids chez l'adulte et permettre d'estimer l'état nutritionnel. C'est un moyen simple et fiable pour dépister l'obésité chez l'homme et la femme adulte, de 18 à 65 ans.

L'IMC n'est pas interprétable de la même manière pour l'enfant, la femme enceinte ou certaines personnes très musclées. De plus, il n'existe pas de définition consensuelle de l'obésité chez la personne âgée.

Les experts de l'International Obesity task Force (organisme lié à l'OMS) définissent cinq classifications en fonction de l'IMC :

- Maigneur : IMC inférieur à 18,5
- Normale : IMC entre 18,5 et 24,9
- Surpoids : IMC entre 25 et 29,9
- Obésité : IMC supérieur à 30
- Obésité massive ou morbide si l'IMC dépasse 40

Bien qu'il existe des critiques au sein de la communauté scientifique concernant l'IMC (notamment il ne tient pas compte du pourcentage de graisse corporelle), c'est toutefois un moyen pratique pour procéder à une première évaluation du poids.

DRS

La « Depression Rating Scale » ou « Echelle de dépression » comprend 7 items (Section E1 du HC et du LTCF) : émission de propos négatifs, perpétuelle colère envers soi-même ou envers les autres, expression (aussi non-verbale) de craintes paraissant non fondées, plaintes répétées concernant la santé, plaintes / inquiétudes anxieuses répétées (ne concernant pas la santé), visage exprimant tristesse, douleur ou inquiétude, pleure facilement.

Pour chaque item, les scores peuvent être 0, 1 ou 2 :

0 = n'est pas survenu au cours des 30 derniers jours

1 = est survenu 5 jours au cours de la semaine

2 = est survenu quotidiennement ou presque (6,7 jours par semaine)

Plus le score est élevé (à partir de 3 sur une échelle de 0 à 14), plus il est probable qu'un trouble dépressif soit potentiellement présent.

2. LTCF

Non présent
