

Déclenchement du CAP Alimentation par sonde

Vous devez compléter les items suivants de l'instrument d'évaluation pour pouvoir générer ce CAP dans BelRAI.

1. Home Care

SECTION C. COGNITION

1. FACULTES COGNITIVES POUR PRENDRE LES DECISIONS COURANTES

Prendre les décisions concernant les tâches de la vie quotidienne- par ex. quand se lever ou prendre les repas, quels vêtements porter ou quelles activités faire

0. **Indépendant(e)** - Décisions logiques raisonnables et sûres

1. **Indépendance relative** - Quelques difficultés seulement dans les situations nouvelles

2. **Déficience minime** - Dans des situations particulières, décisions de mauvaise qualité ou dangereuses; a besoin d'indications / supervision à certains moments

3. **Déficience modérée** - Décisions constamment de mauvaise qualité ou dangereuses; a besoin d'indications / supervision en permanence

4. **Déficience sévère** - Ne prend rarement ou jamais de décisions

5. **Pas de conscience décelable, coma** [Passer à la section G]

SECTION K. ETAT NUTRITIONNEL / BUCCO-DENTAIRE

3. MODE D'ALIMENTATION

0. **Normal** - Avale les aliments de toute consistance

1. **Indépendance modifiée** - par ex. uniquement petites gorgées de liquide, prend des quantités de nourriture limitées, les modifications nécessaires peuvent être inconnues

2. **Requiert des modifications pour avaler les aliments solides** par ex. régimes mixés (purée, hachis) ou ne peut ingérer que des aliments particuliers

3. **Requiert des modifications pour avaler les aliments liquides** - par ex. des liquides épaissis

4. **Ne peut avaler que des purées ET des liquides épaissis**

5. **Combinaison de nourriture orale et parentérale ou par sonde**

6. **Alimentation par sonde naso-gastrique seule**

7. **Alimentation par sonde abdominale** - par ex. PEG

8. **Alimentation parentérale seule** - comprend tous les types de nourriture parentérale, telle la nutrition parentérale totale (NPT)

9. **Activité non accomplie durant la période**

2. LTCF

Idem Home Care